

Til deg som rekvirerer eller tar prøver

Pasientens prøvesvar

En ny nasjonal tjeneste i Kjernejournal er under utprøving. Tjenesten gjør det mulig å dele laboratorie- og radiologisvar mellom helsepersonell, uavhengig av behandlingsnivå, hvem som har rekvirert undersøkelsen og hvor den er utført.

Kort fortalt

Arbeidsflyt: Du rekvirerer prøver og mottar prøvesvar i ditt EPJ som før.

Det nye er at en kopi av prøvesvaret også sendes til Kjernejournal, og at pasienten får tilgang samtidig.

Pasienten får tilgang: Pasienten får tilgang til prøvesvarene på Helsenorge.

Det er viktig at du informerer pasienten når prøven tas, slik at det ikke oppstår unødvendig bekymring når svaret kommer.

Hva bør du informere pasienten din om


Du tar kontakt: Du tar kontakt hvis det er behov for å følge opp prøvesvaret.

Referanseområdet: At et prøvesvar er utenfor referanseområdet, betyr ikke nødvendigvis at pasienten er syk eller at noe må gjøres.

Noen prøver kan ta litt lengre tid: Først når alle undersøkelsene er ferdig analysert blir svaret tilgjengelig for innbygger på Helsenorge.

Personvern: Dersom pasienten ikke ønsker at svar skal vises i Kjernejournal, kan dette settes som innstilling under personvern på Helsenorge.

Varsling: Pasienten kan velge å få varsling når prøvesvarene er klare på Helsenorge. Dette gjøres under varslingsinnstillinger.



Her kan du lese mer om Pasientens prøvesvar og laste ned et informasjonsskriv som forklarer tjenesten nærmere, og som kan deles

nhn.no/tjenester/pasientens-provesvar/for-rekvirenter

Vær oppmerksom på

Vurder om sensitive prøvesvar bør deles, og avklar dette med pasienten. Dette gjelder særlig for helsestasjon for ungdom, overgrepsmottak og fengselshelsetjeneste.

Unntak

Ungdom: Prøvesvar for ungdom mellom 12 og 16 år vises ikke på Helsenorge.

Utsatt innsyn: For å gi behandler tid til å gi god informasjon og oppfølging er pasientens innsyn i prøvesvar fra følgende fagområder utsatt:

Automatisk 14 dagers utsettelse:

- Patologi
- Radiologi
- Nukleærmedisin
- Undersøkelser med kun lokale koder
- Enkelte biokjemiske/immunologiske analyser

Automatisk 3 måneders utsettelse:

- Medisinsk genetik

Du kan sette utsatt innsyn manuelt ved rekvirering. Du kan også i særlige tilfeller nekte pasienten innsyn.